



Diplôme national du brevet
Brevet des collèges — Amérique du Sud, novembre 2008

CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1.

$$A = \frac{2}{5} + \frac{1}{4}; \quad B = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad C = \frac{A}{B}.$$

$$A = \frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{8}{20} + \frac{5}{20} = \frac{13}{20};$$

$$B = \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{8}{20} - \frac{5}{20} = \frac{3}{20}.$$

$$\text{Donc } C = \frac{A}{B} = \frac{\frac{13}{20}}{\frac{3}{20}} = \frac{13}{20} \times \frac{20}{3} = \frac{13}{3}.$$

2. $D = 2^{3 \times 2} = 2^6$; $E = (4 \times 3)^5 = 2^5$; $F = 5^{26-17} = 5^9$.

3. $G = 5\sqrt{32} + \sqrt{18} - 4\sqrt{50} = 5\sqrt{16 \times 2} + \sqrt{9 \times 2} - 4\sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{16} \times \sqrt{2} + \sqrt{9} \times \sqrt{2} - 4\sqrt{25} \times \sqrt{2} = 20\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 20\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Exercice 2

1. a. $H = (x-4)^2 - x(x-10) = x^2 + 16 - 8x - x^2 + 10x = 2x + 16$.

b. $H = 16$ ou $2x + 16 = 16$ soit $2x = 0$ et $x = 0$. 0 est la solution de l'équation.

2. a. $I = (7x-3)^2 - 5^2 = [(7x-3)+5][(7x-3)-5] = (7x-3+5)(7x-3-5) = (7x+2)(7x-8)$.

b. $I = 0$ soit $(7x+2)(7x-8) = 0$ donc $\begin{cases} 7x+2 = 0 \\ 7x-8 = 0 \end{cases}$ et enfin $\begin{cases} x = -\frac{2}{7} \\ x = \frac{8}{7} \end{cases}$

L'équation a deux solutions : $-\frac{2}{7}$ et $\frac{8}{7}$.

Exercice 3

1. Par l'algorithme d'Euclide :

$$5\,148 = 2\,431 \times 2 + 286;$$

$$2\,431 = 286 \times 8 + 143;$$

$$286 = 143 \times 2 + 0.$$

Donc 143 est le PGCD à 5 148 et 2 431.

2. On a $A = \frac{5\,148}{2\,431} = \frac{143 \times 36}{143 \times 17} = \frac{36}{17}$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

L'exercice n° 1 a été supprimé en conformité avec le nouveau programme.

Exercice 2



1. Le triangle MNO est inscrit dans un cercle qui admet pour diamètre l'un e ses côtés [MO] ; il est donc rectangle en N.
2. MNO est rectangle en N, donc (MN) est perpendiculaire à (NO).
De même OPQ étant rectangle en P, donc (PQ) est perpendiculaire à (OP).
Donc les droites (MN) et (PQ) étant toutes deux perpendiculaires à la même droite sont parallèles.
3. Les droites (MN) et (PQ) étant parallèles, la propriété de Thalès permet d'écrire :
$$\frac{ON}{OP} = \frac{OM}{OQ}, \text{ soit } \frac{5}{OP} = \frac{7,5}{4,5} \text{ d'où } OP = \frac{5 \times 4,5}{7,5} = 3 \text{ cm.}$$

PROBLÈME

12 points

PREMIÈRE PARTIE

1. On a $OA = OB$, donc le triangle OAB est rectangle isocèle.
On trace donc un segment [AB] tel que $AB = 8$ et le cercle de diamètre [AB] ; la médiatrice de [AB] coupe le cercle en O.
On trace l'arc de cercle supérieur.
On construit le triangle équilatéral de côté 8 en dessous pour obtenir le point O'. On trace enfin le cercle inférieur de rayon 8.
2. $OA = OB$. Le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle AOB s'écrit :
 $AB^2 = AO^2 + OB^2$ soit $8^2 = 2OA^2$, d'où $32 = OA^2$, donc
 $OA = \sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$ (cm).
La longueur de l'arc de cercle de centre O manquant est le quart de la longueur du cercle de centre O de rayon $4\sqrt{2}$.
La longueur de l'arc de cercle de centre O dessiné est donc égale aux $\frac{3}{4}$ de la longueur du cercle de centre O, soit : $\frac{3}{4} \times 2\pi \times 4\sqrt{2} = 6\pi\sqrt{2}$ (cm).
3. La longueur d'un cercle de rayon 8 est : $2 \times \pi \times 8 = 16\pi$.

DEUXIÈME PARTIE

1. Le triangle OAB est rectangle isocèle en O ; la hauteur [OH] est aussi la médiane donc H est le milieu de [AB] ; donc $AH = \frac{8}{2} = 4$ (cm).
La hauteur [OH] est aussi la bissectrice de l'angle droit, donc $\widehat{OAH} = \widehat{AOH} = 45^\circ$. Donc le triangle OAH est isocèle en H, donc $OH = HA = 4$ (cm).
2. L'aire du triangle AOB est égale à $\frac{AH \times HO}{2} = \frac{4 \times 4}{2} = 8 \text{ cm}^2$.
L'aire du triangle AO'B est égale à $\frac{AB \times O'H}{2} = \frac{8 \times 4\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
3. L'aire du disque de centre O est : $\pi \times (4\sqrt{2})^2 = 32\pi$.
Donc le le secteur d'angle \widehat{AOB} a pour aire $\frac{32\pi}{4} = 8\pi$.
Donc l'aire inférieure de la lentille est égale à :
 $8\pi - 8 \approx 17 \text{ cm}^2$.



Brevet des collèges
Amérique du Sud – novembre 2008



4. On peut faire la même chose pour la partie inférieure :

Le secteur d'angle $\widehat{AO'B}$ correspond à un angle au centre de 60° ; comme

$60 = \frac{360}{6}$, son aire est le $\frac{1}{6}$ de celle du disque de rayon $O'A = 8$, donc d'aire 64π .

Le secteur d'angle $\widehat{AO'B}$ a donc une aire de $\frac{64\pi}{6} = \frac{32\pi}{3}$.

En enlevant à cette aire celle du triangle $O'AB$, on obtient l'aire de la partie supérieure de la lentille soit :

$$\frac{32\pi}{3} - 16\sqrt{3}.$$

Finalement l'aire totale de la lentille est :

$$8\pi - 8 + \frac{32\pi}{3} - 16\sqrt{3} \approx 22,9 \text{ soit au cm}^2 \text{ près } 23 \text{ cm}^2.$$