




On a retiré quelques cases d'un damier. Peut-on recouvrir tout le reste avec des dominos, sans chevauchement ni débordement ? Quand c'est possible, il suffit de le montrer. Quand ça ne l'est pas, il faut le prouver — et c'est là que le problème devient intéressant.

Le damier mutilé

On part d'un damier de **6 cases sur 6**. On en retire **2 cases** — celles dessinées en pointillés ci-dessous.



On dispose de **dominos** : chaque domino recouvre exactement **deux cases voisines**, côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre. On veut recouvrir **toute** la partie grise, sans chevauchement, sans débordement, et sans laisser de case libre.

Les trois questions se suivent : la première se règle par un simple comptage, la dernière demande une véritable preuve.

1. **Combien de dominos** faudrait-il exactement ? Que se passe-t-il si ce nombre n'est pas entier ?
2. On colorie le damier comme un vrai échiquier, en alternant deux couleurs. **Combien reste-t-il de cases de chaque couleur ?** Que recouvre un domino, en termes de couleurs ?
3. **Le recouvrement est-il possible ?** Si oui, en proposer un. Si non, le **démontrer**.



Correction

Le damier mutilé — Correction


L'idée maîtresse. Montrer qu'un pavage existe est facile : il suffit d'en exhiber un. Montrer qu'il n'en existe **aucun** est d'une autre nature — on ne peut pas essayer toutes les dispositions. Il faut trouver une **quantité qui ne change jamais** quand on pose un domino, et constater qu'elle interdit la situation voulue.

1. Le damier complet compte $6 \times 6 = 36$ cases, dont on retire 2 : il en reste **34**.

Nombre de dominos nécessaires : $\frac{34}{2} = 17$

Il faudrait exactement 17 dominos — le compte tombe juste, rien ne s'oppose encore au pavage.

2. Colorions le damier :




Le damier colorié comme un échiquier.

Il reste 17 cases sombres et 17 cases claires.

Ce que fait un domino. Deux cases voisines n'ont jamais la même couleur sur un damier. Donc **tout domino couvre exactement une case sombre et une case claire** — c'est vrai quelle que soit sa position, horizontale ou verticale. C'est l'invariant cherché.

3.

C'est possible. En voici un recouvrement, avec les 17 dominos :



Un recouvrement possible (les couleurs distinguent les dominos les uns des autres).

Il existe en général **plusieurs** recouvrements : celui-ci n'est qu'une solution parmi d'autres. Pour cette question, en exhiber un seul suffit — c'est toute la différence avec une preuve d'impossibilité, qui doit, elle, valoir pour toutes les dispositions à la fois.



Le damier mutilé

Problème — Fiche n°198



PAVA0198

À retenir. Pour prouver qu'une construction est impossible, on cherche une quantité que chaque étape laisse inchangée — ici, l'écart entre le nombre de cases sombres et claires, qu'un domino ne modifie jamais. Ce raisonnement par invariant sert bien au-delà des dominos.